



Initiatives - Conseils - Développement



## **PROSEL**

### **Gestion concertée des Ressources Pastorales et Sécurisation du Petit Elevage**

Rue 74 Porte 20, Sevaré III, Boîte postale 133 Sevaré – Mali, Téléphone/Fax : (223) 242 13 39  
E Mail: [prosel@orangemali.net](mailto:prosel@orangemali.net)

---

**MODULE DE FORMATION DES ELEVEURS RELAIS**

**ELEVAGE DES PINTADEAUX**

**Juillet 2008**

## LA TRICHOMONOSE DES PINTADES

La trichomonose des pintades apparaît avec la saison des pluies. Elle est la cause de la mort de beaucoup de pintades. Elle est surtout meurtrière en milieu et en fin d'hivernage.

### QUE REMARQUE-T-ON ?

Une pintade malade a :

- Une raideur et une paralysie des membres
- Les pattes visiblement déshydratés et sèches
- Le jabot gonflé, dur et rempli d'aliment pâteux
- Une diarrhée jaunâtre et malodorante.

### COMMENT SE TRANSMET LA TRICHOMONOSE ?

Par des déjections des pintades sur l'aliment ou dans l'eau que boivent les autres pintades.

### QUE FAUT-IL FAIRE ?

Il faut traiter les pintades malades avec le Vermifuge Spécial Pintades (VSP).

Quand les pintades sont malades, il faut traiter tout l'élevage de pintades, les malades et les non-malades.


### ATTENTION !

Le VSP n'est pas préventif pour la trichomonose, il ne sert à rien de donner du VSP dans un élevage ou il n'y a pas de pintades malades.

### COMMENT DONNER LE VSP ?


- 1 comprimé pour une pintade adulte
- ½ comprimé pour une jeune pintade de plus de 2 mois
- Toujours donner beaucoup d'eau aux pintades.
- **Ne traiter que les pintades de plus de 2 mois. (Pour les jeunes pintadeaux de moins de 2 mois, il faut donner un autre médicament).**

### QUE REMARQUE- T – ON ?



## COMMENT SE TRANSMET LA MALADIE ?

La pintade en bonne santé boit l'eau : elle sera malade dans quelques jours




La pintade malade contamine l'eau avec sa diarrhée

La pintade malade donne la maladie aux autres pintades en mettant ses excréments sur l'eau ou la nourriture

## QUE FAUT-IL FAIRE ?

Pintadeau de plus de 2 mois **un demi (1/2)** comprimé de VSP



Pintade adulte **1 comprimé de VSP**


**Donner beaucoup d'eau**

## 3-7LA PROTECTION DES POUSSINS ET DES PINTADEAUX

- Les poussins et les pintadeaux sont très fragiles.
- Les maladies et les prédateurs s'attaquent facilement à eux.
- Ils ont aussi beaucoup de risques d'accident.

## COMMENT LES PROTEGER ?


Jusqu'à l'âge de 1 mois on peut les sauver en les protégeant sous un panier. Il faut placer le panier à l'ombre sur un sol sec et propre.



A partir de 1 mois d'âge, on soulève le panier de manière à laisser les poussins entrer et sortir comme ils veulent et s'abriter en cas de danger. Le soir, faites entrer les poussins en lieu sûr (dans la cuisine) toujours sous le panier




A partir de 2 mois, on les vaccine contre la maladie de Newcastle et ils vont avec les poules.



## 3-8 DONNER A BOIRE ET A MANGER AUX POUSSINS

Ils doivent avoir en permanence de l'eau propre sous le panier. On utilisera un **abreuvoir** qui évite les noyades.



Pour la nourriture, on peut utiliser le mélange suivant :






**2 mesures** de boîte de tomate de son.

**1 mesure** de boîte de tomate de céréales.

On peut y ajouter un peu de poudre d'os calciné, de poudre de poisson, du sel, de la verdure et quelques termites.

Donner ce mélange à volonté. Mais éviter le gaspillage.

On utilisera des **mangeoires** faites à l'aide de vieilles boîtes de conserves.



### 3-9 PROTÉGER LES PINTADEAUX DE MOINS DE 2 MOIS !

Ce sont des sujets fragiles et ils n'est toujours facile de les soigner. Leur plus grand ennemi est le refroidissement consécutif à une pluie ou à une nuit fraîche. Ce qui se traduit par une diarrhée et une forte mortalité.

Il est vraiment **indispensable de bien abriter les pintadeaux** et au besoin de **les réchauffer en plaçant une lampe à pétrole dans leur abri**.

Le médicament le plus efficace pour les maladies des pintadeaux est l'OXYFURAN que votre vétérinaire saura vous indiquer.

